

# Erhebungsbogen Pathologie

In dem vorliegenden „Erhebungsbogen Pathologie“ sind die Anforderungen zusammengefasst, die der Kooperationspartner Pathologie in DKG-zertifizierten Onkologischen Zentren und/oder Organkrebszentren erfüllen muss. Der Erhebungsbogen Pathologie stellt somit eine Anlage zu dem Erhebungsbogen Onkologische Zentren und den organspezifischen Erhebungsbögen dar.

Name des Instituts <sup>1) 2)</sup>

---

Leitung des Instituts

---

Ansprechpartner Zertifizierung

---

Anschrift

---

Telefon

---

E-Mail

---

<sup>1)</sup> Definition Standort: Der Standort ist über die Anschrift definiert. 1 Standort ist 1 Kooperationspartner des Zentrums, unabhängig von ggf. bestehenden unterschiedlichen Organisations-/Rechtsformen (Praxis, Teil des Klinikums, MVZ ...). In der Registrierung als Kooperationspartner ist nur die Führung 1 Namens möglich (Kunstname aus Kombination der Rechtsformen möglich).

<sup>2)</sup> Ggf. zusätzlich bestehende Schnellschnitllabore sind auf der nachfolgenden Seite anzugeben.

## Geltungsbereich der Pathologie (standortbezogen)

<input type="checkbox"/> OZ	<input type="checkbox"/> MKHT	<input type="checkbox"/> MKIO	<input type="checkbox"/> MNOZ	<input type="checkbox"/> MSAR	<input type="checkbox"/> BZ	<input type="checkbox"/> GZ	<input type="checkbox"/> DZ
<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> ML	<input type="checkbox"/> MM	<input type="checkbox"/> MP	<input type="checkbox"/> MS	<input type="checkbox"/> HAEZ	<input type="checkbox"/> HZ	<input type="checkbox"/> LZ
<input type="checkbox"/> PZ	<input type="checkbox"/> MB	<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> MN				

## Erstellung / Aktualisierung Erhebungsbogen Pathologie

### Abkürzungsverzeichnis:

- **Onkologisches Zentrum** = OZ; **Uroonkologisches Zentrum** = UZ; **Viszeralonkologisches Zentrum** = VZ
- **Organkrebszentren:** BZ = Brustkrebszentrum, DZ = Darmkrebszentrum, GZ = Gynäkologisches Krebszentrum, HAEZ = Zentrum für Hämatologische Neoplasien, HZ = Hautkrebszentrum, LZ = Lungenkrebszentrum, PZ = Prostatakrebszentrum
- **Module:** MA = Analkarzinomzentrum, MB = Harnblasenkrebszentrum, MH = Hodenkrebszentrum, MKHT = Kopf-Hals-Tumor-Zentrum, MKIO = Kinderonkologisches Zentrum, ML = Leberkrebszentrum, MM = Magenkrebszentrum, MN = Nierenkrebszentrum, MNOZ = Neuroonkologisches Zentrum, MP = Pankreaskarzinomzentrum, MS = Speiseröhrenkrebszentrum, MSAR = Zentrum für Tumoren/ Sarkome des Weichgewebes

### Inkraftsetzung am 28.09.2022

Der hier vorliegende Erhebungsbogen ist für alle ab dem 01.01.2023 durchgeführten Audits verbindlich anzuwenden. Die vorgenommenen Änderungen gegenüber der im Auditjahr 2022 gültigen Version sind in diesem Erhebungsbogen farblich „grün“ gekennzeichnet.

Hinweis: Im Sinne einer gendergerechten Sprache verwenden wir für die Begriffe „Patientinnen“, „Patienten“, „Patient\*innen“ die Bezeichnung „Pat.“, die ausdrücklich jede Geschlechtszuschreibung (weiblich, männlich, divers) einschließt.

## Mehrstandortiges Pathologisches Institut (Verbundstruktur)

Der Erhebungsbogen bezieht sich auf 1 Standort. Pathologien, die mehrere Standorte umfassen (= Verbund), müssen den Erhebungsbogen für jeden Standort bearbeiten. Ausschließliche Schnellschnitt-Einrichtungen stellen im Sinne der Zertifizierung keinen Standort dar.

Standort eines Verbundes

ja

nein

Wenn „nein“, dann sind nachfolgende Angaben nicht relevant.

Name des Verbundes

---

Anmerkungen zum  
Verbund (optional)

---

Nr.	Name der Standorte des Verbundes, die am Zert.system beteiligt sind <sup>3) 4)</sup>	Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort)
1		
2		
3		
4		
5		

<sup>3)</sup> sofern ein Hauptstandort besteht, ist dieser an erster Stelle zu nennen

<sup>4)</sup> Abdeckung sämtlicher zertifizierungsrelevanter Anforderungen; keine Schnellschnitllabore

## Strukturdaten zum Standort

### A. Organisationsstruktur (Mehrfachnennung möglich) <sup>5)</sup>

Klinikabteilung

(Teilbereich) MVZ

Eigenständiges Institut

<sup>5)</sup> Mischformen → Mehrfachnennung möglich; führende Organisationsstruktur mit „X“ und weitere Strukturformen mit „n“ kennzeichnen

### B. Trägerstruktur / Rechtsform (Mehrfachnennung möglich)

Öffentlicher Krankenhausträger

Kirchlicher Krankenhausträger / Gemeinnützig

Privater Krankenhausträger

Inhabergeführt von Ärzten



## F. Molekularpathologie

Molekularpathologie vor Ort

 ja

 nein

Sofern Molekularpathologie in Kooperation erfolgt, sind die Kooperationspartner für die Molekularpathologie in der nachfolgenden Liste aufzuführen (Mehrfachnennungen möglich).

Nr.	Molekularpathologie	Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort)
1		
2		
3		
4		

### 8.1 Interdisziplinarität

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<p>Kooperationsvereinbarung Wenn die Kooperationspartner eines Zentrums unter einer Trägerschaft beziehungsweise an einem Klinikstandort arbeiten, sind schriftliche Vereinbarungen nicht notwendig (Umsetzung der nachfolgenden Punkte muss dennoch sichergestellt sein).</p> <p>Folgende Punkte sind zu regeln: (siehe auch „Vorlage Kooperationsvereinbarung“)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung der für das Zentrum relevanten Behandlungsprozesse unter Berücksichtigung der Schnittstellen</li> <li>• Verpflichtung zur Umsetzung ausgewiesener Leitlinien</li> <li>• Beschreibung der Zusammenarbeit hinsichtlich der Tumordokumentation</li> <li>• Bereitschaftserklärung für die Zusammenarbeit hinsichtlich interner/externer Audits</li> <li>• Verpflichtungserklärung für die Einhaltung der relevanten DKG-Kriterien sowie der jährlichen Bereitstellung der relevanten Daten</li> <li>• Einhaltung Schweigepflicht</li> <li>• Mitwirkung an Weiterbildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Einverständniserklärung öffentlich als Teil des Onkologischen Zentrums ausgewiesen zu werden (z.B. Homepage)</li> </ul>	
	<p>Tumorkonferenz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindliche Teilnahme Pathologie</li> <li>• Sicherstellung Verfügbarkeit Facharzniveau</li> <li>• Teilnahme- und Abstimmungsregelung bei mehr als 1 Kooperationspartner pro Fachrichtung (siehe auch Regelung „Interdisziplinäre Zusammenarbeit“)</li> </ul>	
HZ	Teilnahme Pathologe/Dermatohistologe fakultativ	
	<p>Demonstration Bildmaterial Pat.bezogenes Bildmaterial (z.B. Pathologie, Radiologie) muss bei der Konferenz verfügbar sein</p>	

### 8.1 Interdisziplinarität

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	und es muss eine geeignete technische Ausstattung für die Darstellung des Bildmaterials vorhanden sein. Eine EDV-gestützte Darstellung ist ausreichend.		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
BZ	Besprechung besonderer Fälle Besondere Fälle werden in den Qualitätszirkeln und/oder der interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen.		

### 8.2 Fallzahlen pro Pathologisches Institut

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Fallzahlen Pathologisches Institut Jährlich mind. 10.000 Histologien (Fallzahlen, Nachweis über Journal-Nr.)		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
GZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jährl. mind. 100 Histologien von Fällen mit Genitalmalignom (d.h. invasive Neoplasien des weiblichen Genitals und BOT) (Anforderung aus Kapitel OP)</li> </ul>		
DZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jährl. mind. 50 Histologien von Kolon- / Rektumbiopsien</li> <li>Jährl. mind. 50 Histologien von Kolon- / Rektumpräparaten</li> </ul>		
MA	Jährl. mind. 10 Histologien von Analbiopsien oder Resektaten von Analkarzinomen		
ML	Jährl. mind. 10 HCC-Histologien		
MM	Jährl. mind. 30 Histologien von Karzinomen des Magens/ AEG		
MP	Jährl. mind. 12 Pankreasoperationshistologien		
MS	Jährl. mind. 30 neoplastische Ösophagus-Histologien (inkl HGD, HGIEN)		
HZ	Dermatohistologische/pathologische Erfahrung <ul style="list-style-type: none"> <li>Jährl. mind. 250 Histologien von malignen Hauttumoren (nicht nur Primärfälle)</li> <li>Erfahrung Beurteilung von Lymphknoten (alle Tumorentitäten): Jährlich mind. 100 Histologien von Lymphknoten</li> </ul> (Die Untersuchung der Lymphknoten nach Lymphadenektomie (LAD) muss von einem Facharzt für Pathologie durchgeführt werden. Ggf. kann dies auch im Rahmen einer berufsgruppenübergreifenden Zweitbefundung nach Befundung durch einen Facharzt für Dermatologie mit Zusatzbezeichnung Dermatohistologie erfolgen. Sentinel bei Hauttumoren: Beurteilung durch Facharzt für Dermatologie mit Zusatzbezeichnung „Dermatohistologie“ oder Facharzt für Pathologie)		
MB	Jährl. mind. 50 maligne Harnblasentumore		

## 8.2 Fallzahlen pro Pathologisches Institut

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
MN	Jährl. mind. 30 maligne Nierentumore		
MNOZ	Fallzahlen Institut/Abteilung für Neuropathologie Jährlich mind. 1.000 histologische inkl. zytologische und immunhistochemische Untersuchungen (Fallzahlen, Nachweis über Journal-Nr.)		
MSAR	Jährl. mind. 100 Histologien von Sarkomen gemäß Versorgungsumfang (Diagnosenliste laut Datenblatt); dokumentierte Doppelbefundung wird anerkannt.		
Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021			

## 8.3 Fachärzte - Anzahl / Qualifikation

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<b>Onkologische Zentren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mind. 3 FÄ für Pathologie, wenn das Onkologische Zentrum ausschließlich durch 1 pathologisches Institut betreut wird</li> <li>Ansonsten gilt: Mind. 2 Fachärzte für Pathologie pro betreuendem Institut</li> </ul>		
	Leitung <ul style="list-style-type: none"> <li>Facharzt für Pathologie</li> </ul> Anforderungen (wünschenswert) Befugnis zur Weiterbildung im Bereich der Pathologie.		
	<b>Organkrebszentren/Module</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 2 qualifizierte Fachärzte für Pathologie</li> </ul>		
	<b>Organspezifische Besonderheiten:</b>		
BZ	Qualifikation Facharzt <ul style="list-style-type: none"> <li>Histologische Beurteilung von Mamma-Gewebsproben</li> <li>Gewebsbeurteilung aus anderen Körperregionen</li> <li>Ergusszytologie aus den serösen Höhlen, Aspirationszytologie</li> <li>Qualifizierte Vertretungsregelung ist abgesichert</li> <li>Erfahrung mit Aufarbeitung des Sentinel-Lymphknotens nach aktuell gültigen Leitlinien</li> <li>Erfahrung mit Aufarbeitung von Gewebeproben der Brust und der axillären Lymphknoten entsprechend der S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms</li> <li>Kenntnisse der in den Leitlinien festgelegten Qualitätsindikatoren</li> </ul>		
HZ	Fachärzte <ul style="list-style-type: none"> <li>Mind. 1 Facharzt für Dermatologie mit Zusatzbezeichnung „Dermatohistologie“ <u>und</u> 1 Facharzt für Pathologie</li> </ul> oder		

### 8.3 Fachärzte - Anzahl / Qualifikation

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Fachärzte für Pathologie</li> </ul>		
MKHT	Fachärzte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 1 Facharzt für Pathologie aus der Gesamtzahl der Pathologen des Onkologischen Zentrums.</li> <li>• Vertretungsregelung mit gleicher Qualifikation ist schriftlich zu belegen.</li> </ul>		
MKIO	Fachärzte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Facharzt für Pathologie, der Ansprechpartner für die Kinderonkologie ist, steht dem Zentrum werktätig (Mo.-Fr.) zur Verfügung.</li> <li>• Alle kinderonkologischen Fälle sind durch je einen festen Ansprechpartner mit Kinderexpertise zu begutachten.</li> <li>• Vertretungsregelung mit gleicher Qualifikation ist schriftlich zu belegen.</li> <li>• Die Abteilung ist namentlich zu benennen.</li> </ul>		
MNOZ	Fachärzte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 2 Neuropathologen stehen dem Zentrum zur Verfügung (ggf. in Kooperation).</li> </ul>		
MSAR	Fachärzte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 1 Facharzt für Pathologie aus der Gesamtzahl der Pathologen des Onkologischen Zentrums.</li> <li>• Vertretungsregelung mit gleicher Qualifikation ist schriftlich zu belegen.</li> </ul>		

### Fachärzte Pathologisches Institut

Name, Vorname	Titel	Facharzt (FA)	VK (Vollzeit) oder Teilzeit in %	Zusatzqualifikation / Organschwerpunkt <sup>9)</sup>

<sup>9)</sup> Die Anforderung an die Fachliche Expertise für die entsprechende Tumorentität ist im Folgenden aufgeführt.

### 8.4 Fachärzte - Expertise

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
BZ	Erfahrung Facharzt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährlich mind. 100 Routinehistologien von Mammafällen</li> </ul>		
GZ	20 Histologien von Fällen mit Genitalmalignom d.h. invasive Neoplasien des weiblichen Genitals, BOT und STIC/Jahr pro benanntem Facharzt (inkl. PE)		

#### 8.4 Fachärzte - Expertise

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
MKHT	Der Facharzt muss pro Jahr mindestens 60 maligne Kopf-Hals-Tumoren begutachten, dokumentierte Doppelbefundung wird anerkannt (30 Fälle präoperativ, 30 Fälle postoperativ).		
LZ	Jeder benannte Facharzt muss jährlich 100 maligne Lungentumoren begutachten. <b>Bei zusätzlicher Zertifizierung als Mesotheliomeinheit:</b> Einer der für das LZ benannten Fachärzte für Pathologie muss mindestens 10 histologische Diagnosesicherungen eines Mesothelioms pro Jahr nachweisen. Wird die Mindestvorgabe nicht erreicht, sind alle Diagnosen in Kooperation mit der externen Referenzpathologie zu erbringen.		
PZ	Der Facharzt muss jährlich 100 Prostatafälle begutachten.		

#### 8.5 MTA's

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Eine ausreichende Anzahl qualifizierter MTA's / Technischer Assistenten muss zur Verfügung stehen.		

#### 8.6 Vorzuhaltende Verfahren

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Vorzuhaltende Verfahren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immunhistochemische Untersuchungen</li> <li>• In-situ-Hybridisierungen (nicht für PZ)</li> <li>• Molekularpathologie (nicht für PZ)</li> </ul> <p>Die Beauftragung dieser Spezialleistungen darf nur an Pathologische Institute erfolgen, die mit Vorlage einer Kooperationsvereinbarung zu benennen ist. Die Institute sollten über ein anerkanntes QM-System oder eine gültige Akkreditierung verfügen oder die erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen nachweisen.</p>		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
HZ	Vorzuhaltende Verfahren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immunhistochemische Untersuchungen</li> <li>• Molekularpathologie</li> </ul> <p>Die Beauftragung dieser Spezialleistungen nach extern darf nur an Pathologische Institute erfolgen, die mit Vorlage einer Kooperationsvereinbarung zu benennen ist. Die Institute sollten über ein anerkanntes QM-System oder eine gültige</p>		

## 8.6 Vorzuhaltende Verfahren

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	Akkreditierung verfügen oder die erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen nachweisen.	
LZ	<p>Nachweis einer qualitätsgesicherten NGS-Diagnostik.            Diagnostik muss erfolgen über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nNGM-Zentrum oder</li> <li>• Akkreditierte Molekularpathologie (DIN EN ISO17020) mit Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an nationalen und/oder internationalen Ringversuchen zu diagnostisch verpflichtenden Testungen bei Lungenkrebs (EGFR, BRAF, ALK, ROS1, RET, NTRK).            Nachweis der gültigen Ringversuchszertifikate.</li> </ul>	
	Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021	

## 8.7 Obduktionen

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	Innerhalb des Zentrums muss die uneingeschränkte Möglichkeit zur Durchführung von Obduktionen bestehen und bei HZ/PZ gefördert werden. Ein Obduktionsraum ist nachzuweisen (ggf. in Kooperation).	

## 8.8 Schnellschnitte

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für Schnellschnitte müssen für jeden operativen Standort gegeben sein.</li> <li>• Betriebsbereitschaft Kryostat muss sichergestellt sein (gilt nicht für HZ).</li> <li>• Teleschnellschnitte sind nicht zulässig.</li> </ul>	
	Parameter Schnellschnitte Zeitbedarf (in min.) und Zeitpunkt gemessen ab Eingang Pathologie bis Durchsage des Ergebnisses (Richtwert max. 30 min.) Auswertung Zeitbedarf: Min./Max./Range-Wert	
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>	
MNOZ	Beurteilung Schnellschnitte/ Präparate <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Schnellschnitte/Präparate sind durch Neuropathologen zu befunden (i.d.R. vor Ort, ggf. über Kooperation; Kooperationen &gt; 45 km sind zu begründen).</li> <li>• In Ausnahmefällen kann der Zuschnitt des Schnellschnitts durch Pathologen vor Ort erfolgen. Die telemedizinische, mikroskopische Beurteilung des Schnellschnitts muss in diesen Fällen durch den Facharzt für Neuropathologie durchgeführt werden.</li> </ul>	

### 8.9 Zeit histologisches Ergebnis

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
BZ	Zeit bis zum histologischen Ergebnis (Stanze): Anforderung: innerhalb von 2 Werktagen  Zeit bis zum Ergebnis Routine-Histologie inkl. Immunhistochemie Anforderung: max. 5 Werktagen	
VZ DZ MA	Zeit histologisches Ergebnis • Biopsate / Polypen max. 3 Werktagen • OP-Präparate max. 5 Werktagen	
LZ	Zeit bis zum ersten pathologischen Befund (Primärdiagnostik) Anforderung: ≤ 3 Arbeitstage	
MKHT	Zeit bis zum Ergebnis Routine-Histologie Anforderung: ≤ 5 Werktagen (Ausnahmen sind zu begründen)	
MSAR	Zeit bis zum ersten pathologischen Befund Anforderung: ≤ 5 Arbeitstage (Ausnahmen sind zu begründen, z.B. Entkalkung)	
Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021		

### 8.10 Aufbewahrungszeiten

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archivierung Paraffinblöcke ≥ 10 Jahre</li> <li>Aufbewahrung Feuchtmaterial ≥ 4 Wochen nach Eingang</li> <li>Die Möglichkeit zur Kryopräservierung sollte gegeben sein</li> </ul>	
LZ	Asservierung von tumorfreiem Lungengewebe, z.B. für Staubanalyse, bei entsprechenden klinischen Angaben	
Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021, Verschiebung aus Kapitel 8.11		

### 8.11 Pathologieberichte

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	Pathologieberichte müssen für die makroskopische und die mikroskopische Begutachtung zu 100% die in der Leitlinie geforderten Angaben enthalten (Insbesondere: Histologischer Typ nach aktueller WHO-Klassifikation, Grad, TNM-Stadium (GZ: oder FIGO), R-Klassifikation).	
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>	
BZ	Pflichtangaben Pathologiebericht <ul style="list-style-type: none"> <li>Peritumorale Lymphgefäßinvasion- und Veneninvasion</li> <li>Östrogen- u. Progesteronrezeptorstatus</li> </ul>	

## 8.11 Pathologieberichte

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HER-2-Status (Vorgehen bei fraglich positiven HER-2-Status (2+) ist zu regeln (z.B. über FISH-/CISH-Analyse)</li> <li>• Multifokalität/Multizentrität</li> <li>• Ki-67-Proliferationsindex invasiver Karzinome (fakultativ)</li> </ul>	
GZ	<p>Pflichtangaben Pathologiebericht Nach Trachelektomie bzw. radikaler Hysterektomie (Zervixkarzinom) und bei Vulvapräparaten (Vulvakarzinom):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis/Fehlen von Lymph- oder Veneninvasion (L- und V- Status)</li> <li>• Nachweis/Fehlen von Perineuralscheideninfiltraten (Pn-Status),</li> <li>• Invasionstiefe und Ausdehnung in mm bei pT1a1 und bei Zervixkarzinom pT1a2</li> <li>• dreidimensionale Tumorgöße in cm (ab pT1b1)</li> </ul> <p>zusätzlich nach/bei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radikaler Hysterektomie (Zervixkarzinom): Bei konisierten Patientinnen Staging (TNM) unter Berücksichtigung des Konisationsbefundes</li> <li>2. Vulvapräparaten mit Vulvakarzinom: Metrische Angabe minimaler Abstand Karzinom/VIN zum vulvären Resektionsrand und zum Weichgeweberesektionsrand</li> </ol> <p>Bei Resektion des vulvo-vaginalen bzw. vulvo-analen Übergangs und ggf. der Urethra metrische Angabe zu entsprechenden Resektionsrändern</p>	
	<p>Pflichtangaben Pathologiebericht - Endometrium <b>Fraktionierte Abrasio</b> Beim Nachweis von Tumorgewebe in der Zervixfraktion einer fraktionierten Abrasio soll zum Nachweis bzw. Fehlen einer endozervikalen Stromainfiltration dezidiert Stellung genommen werden</p> <p><b>Hysterektomiepräparat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• histologischer Typ nach WHO</li> <li>• bei gemischten Karzinomen mit Angabe des jeweiligen prozentualen Anteils am Gesamtumor</li> <li>• Grading</li> <li>• Nachweis/Fehlen von Lymph- oder Blutgefäßeinbrüchen (L- und V-Status)</li> <li>• Nachweis/Fehlen von Perineuralscheideninfiltraten (Pn-Status)</li> <li>• Staging (pTNM)</li> <li>• metrische Angabe der Invasionstiefe im Verhältnis zur Myometriumdicke in mm</li> <li>• dreidimensionale Tumorgöße in cm</li> <li>• bei vorliegender Scheideninfiltration metrische Angabe des minimalen Abstandes zum vaginalen Resektionsrand</li> </ul>	

**8.11 Pathologieberichte**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>R-Klassifikation (UICC)</li> </ul>	
DZ	Pflichtangaben Pathologiebericht <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalisation</li> <li>Angabe des Pathologen zu den Resektionsrändern und minimalen Sicherheitsabstand hat grundsätzlich zu erfolgen (Qualitätsindikator Leitlinie); (Abweichungen sind zu begründen).</li> <li>Lymph-/Venen-/Perineuralscheideninvasion</li> <li>TME-Qualität (Qualitätsindikator Leitlinie) / CRM-Qualität</li> <li>Tumorregressionsgrad bei neoadjuvanter Therapie (fakultativ)</li> </ul>	
MA	<b>Pflichtangaben Pathologiebericht</b>  <b>nach lokaler Exzision:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>R-Status allseits (auch zur Tiefe)</li> <li>HPV/p16-Status</li> <li>Graduierung (Plattenepithelkarzinom, M. Paget, Adenokarzinom, GIST, lymphoma, Sarkom, NET, etc.)</li> </ul> <b>nach Exstirpation zusätzlich:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lymphknotenstatus</li> <li>Nachweis/Fehlen von Lymph- oder Blutgefäßeinbrüchen (L- und V-Status)</li> <li>Nachweis/Fehlen von Perineuralscheideninfiltraten (Pn-Status)</li> <li>Tumorregressionsgrad nach komb. Radiochemotherapie</li> </ul>	
ML	Pflichtangaben Pathologiebericht Status der Umgebungsleber	
MM	Pflichtangaben Pathologiebericht <ul style="list-style-type: none"> <li>Tumorlokalisierung</li> <li>Lauren-Klassifikation</li> <li>Lokale Tiefeninfiltration soweit nicht im TNM enthalten</li> <li>Veneninvasion, Lymphgefäß- und Perineuralscheideninvasion</li> </ul>	
MP	Pflichtangaben Pathologiebericht <ul style="list-style-type: none"> <li>Status an der Resektionsfläche zum Restpankreas und an den circumferentiellen Resektionsrändern (Tuschemarkierung)</li> <li>R0 narrow/wide</li> <li>Lymphgefäßinvasion</li> <li>Veneninvasion</li> <li>Perineuralscheideninvasion</li> </ul>	
MS	Pflichtangaben Pathologiebericht: Grundsätzlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>Art der neoplastischen Läsion (LGD, LGIEN, HGD, HGIEN, Karzinom)</li> </ul> Im speziellen: Biopsie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Läsionen im distalen Ösophagus: Becherzell-haltige Barrett-Mukosa?</li> </ul> Exzidat nach endoskopischer Resektion:	

**8.11 Pathologieberichte**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe der Läsion in 3 Dimensionen (gilt nicht für EMR, dort vertikale Dimension)</li> <li>• Maximale Tiefe der Infiltration (T und <math>\mu\text{m}</math>)</li> <li>• Veneninvasion, Lymphgefäßinvasion</li> <li>• Low vs High Risk-Resektionsränder bzw.</li> <li>• Bei in toto Resektion: zirkulärer u basaler Resektionsrand</li> </ul> <p>OP-Resektate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe der Läsion in 3 Dimensionen</li> <li>• Lokalisation des Tumorzentrums in Bezug zum ösophagogastralen Übergang u. Angabe Kreuzung des ösophagogastralen Übergangs</li> <li>• Orale, aborale u. zirkumferentielle Resektionsränder</li> <li>• Veneninvasion, Lymphgefäßinvasion</li> <li>• Nach neoadjuvanter Therapie: Angabe Regressions-Score</li> </ul>		
HZ	<p>Befundberichte</p> <p>Befundberichte müssen für die makroskopische und die mikroskopische Begutachtung zu 100% die in den Leitlinien geforderten Angaben enthalten (Insbesondere: Histologischer Typ nach aktueller WHO-Klassifikation, Grad, TNM-Stadium, R-Klassifikation).</p>		
HZ	<p>Zusätzliche Angaben Melanom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumordicke nach Breslow, Ulzeration, Fakultativ: Mitoserate bei Tumordicke &lt; 1 mm nach der AJCC-Klassifikation 2017.</li> <li>• Histopathologische Besonderheiten, wie mögliche Assoziation zu einem melanozytären Nävus, eine Regressionszone, morphologische Besonderheiten (z. B. desmoplastische Melanomanteile) und Gefäßeinbrüche</li> </ul>		
MKHT	<p>Pflichtangaben Pathologiebericht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumorlokalisierung (klinische Angabe ist Verantwortlichkeit des Klinikers);</li> <li>• Makroskopische Tumorgröße;</li> <li>• Invasionstiefe (für Tumoren des Mundbodens, der Wange und der oralen Zunge);</li> <li>• Lymphgefäßinvasion, Blutgefäßinvasion und Perineurale Invasion;</li> <li>• Lokal infiltrierte Strukturen;</li> <li>• Lymphknoten: Pro Lokalisation/ Level Anzahl präparierte und tumorbefallene LK (suffiziente Kennzeichnung ist Verantwortlichkeit des Klinikers); Durchmesser der größten Metastase; Vorhandensein/ Fehlen extrakapsulärer Ausbreitung</li> <li>• Sicherheitsabstand zu den Resektionsrändern</li> <li>• Klassifikation pT: notwendige Angaben durch die Klinik: Angaben zu befallenen Bezirken und Unterbezirken, infiltrierte anatomische Strukturen, Fixation von Larynx, Beweglichkeit/ Fixation der Stimmklappen sind Verantwortlichkeit des Klinikers</li> </ul>		

**8.11 Pathologieberichte**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
LZ	<p>Pflichtangaben Pathologiebericht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestimmung Regressions-Grading oder der kompletten pathologischen Regression bei neoadjuvant behandelten Pat.</li> <li>• Beschreibung der Tumorlokalisierung</li> <li>• Asservierung von tumorfreiem Lungewebe, z. B. für Staubanalyse, bei entsprechenden klinischen Angaben</li> </ul> <p>Ein Template zur Erstellung leitliniengerechter, vollständiger Pathologieberichte für Biopsien oder Resektionspräparate von Lungenkarzinomen kann heruntergeladen werden unter:  <a href="https://www.krebsgesellschaft.de/zertdokumente.html">https://www.krebsgesellschaft.de/zertdokumente.html</a></p> <p><b>Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021, Verschiebung ins Kapitel 8.10</b></p>	
PZ	<p>Makroskopische Bearbeitung Prostatektomie-Präparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausmessung (mm) in 3 Dimensionen</li> <li>• Tuschemarkierung (ventral und dorsal verschiedenfarbig für Bestimmung minimaler Randsaum)</li> <li>• Vesikale und apikale Absetzungsflächen sollen ebenfalls mit Tusche markiert werden. Beide Flächen sollen in Form 3-5 mm dicker Scheiben im rechten Winkel zur Urethra abgetrennt werden.</li> <li>• Die Scheiben sollen anschließend parasagittal lamelliert und komplett eingebettet werden.</li> <li>• Die Absetzungsränder beider Samenleiter und beide Samenblasen sollen seitengetreunt eingebettet werden.</li> <li>• Transversale Lamellierung (3-5 mm) und komplette Einbettung</li> </ul>	
PZ	<p>Befundbericht Stanzbiopsie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Ergebnis der präoperativen Histologie liegt innerhalb von 5 Werktagen vor.</li> <li>• Positionen müssen entsprechend den klinischen Angaben gekennzeichnet sein.</li> <li>• Verarbeitung unter Beibehaltung der Positionskennzeichnung.</li> <li>• Anzahl u. Lokalisation Karzinom-positiver Gewebeprobe.</li> <li>• Semiquantitative Abschätzung des Prozentsatzes der Gesamtkarzinomfläche /Gesamtstanzzyylinderfläche.</li> <li>• Gleason-Grad: Angabe aller primären und sekundären Grade sowie des am wenigsten differenzierten Grads, jeweils in „%“. Angabe des Gesamt-Gleason Scores entsprechend der von der ISUP 2014 konsentierten Modifikationen. Angabe für jede tumorbefallene Stanze separat. Differenzierung nach</li> </ul>	

**8.11 Pathologieberichte**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<p>Gleason-Grad 1 und 2 ist weiterhin anzugeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lymphgefäß- (L) und Venen- (V) Invasion (L0 oder L1, V0 oder V1).</li> <li>• Perineuralscheiden Infiltration (Pn0 oder Pn1)</li> <li>• wenn beurteilbar, sollen eine Kapselinfiltration, ein kapselüberschreitendes Wachstum und eine Samenblaseninfiltration angegeben werden.</li> </ul>		
PZ	<p>Befundbericht der Prostatektomie-Präparate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Ergebnis der postoperativen Histologie liegt innerhalb von 7 Werktagen vor.</li> <li>• Karzinomlokalisierung und semiquantitativ geschätzte Tumorausdehnung (% des befallenen Parenchyms).</li> <li>• pT2-4-Kategorie und Parameter wie für die Stanzbiopsie (8.11)</li> <li>• Unterteilung der Kategorie pT3a nach Epstein et al. {Epstein, 1996 860 /id} in fokale Kapselpenetration und etablierte Kapselpenetration</li> </ul>		
MB	<p>Befundbericht TUR-B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnis der Histologie innerhalb von 5 Werktagen</li> <li>• Vollständige Einbettung des Materials</li> <li>• Angaben Befundbericht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Angabe von Tumorstadium, Tumorgrad nach WHO 1973 und 2016</li> <li>○ Vorhandensein oder Abwesenheit eines Carcinoma in situ, Lymph- und Blutgefäßinvasion (L, V)</li> <li>○ Anwesenheit von Detrusor – Muskulatur</li> </ul> </li> </ul> <p>Befundbericht Zystektomie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnis der Histologie innerhalb von 7 Arbeitstagen</li> <li>• Makroskopische Aufarbeitung: Absetzungsränder Urethra und Ureteren beidseits, vollständige Einbettung aller sichtbaren Tumoren und Urothelveränderungen</li> <li>• Exemplarische Untersuchung des Urtothels verschiedener Regionen</li> <li>• Farbmarkierung und Untersuchung der Absetzungsränder zur Tiefe</li> <li>• Angaben Befundbericht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tumorstadium, TNM-Klassifikation, Tumorgrad nach WHO 1973 und 2016</li> <li>○ Lymph- und Blutgefäßinvasion sowie Perineuralscheideninvasion (L,V,Pn)</li> <li>○ Absetzungsränder</li> <li>○ Anwesenheit eines Carcinoma in situ</li> </ul> </li> </ul>		
MH	<p>Befundbericht des Hodenpräparates</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenangabe</li> <li>• Hodengröße</li> <li>• max. Tumorgöße (in 3 Dimensionen)</li> </ul>		

**8.11 Pathologieberichte**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• makroskopische Merkmale d. Nebenhodens, Samenstranges und der Tunica vaginalis</li> <li>• Tumor im Absetzungsrand (ja/nein)</li> <li>• histolog. Typ mit Spezifizierung individueller Komponenten und prozentualer Bestimmung gemäß WHO 2016</li> <li>• peritumorale venöse und/oder lymphatische Invasion</li> <li>• Invasion der Tunica albuginea (ja/nein)</li> <li>• Invasion der Tunica vaginalis (ja/nein)</li> <li>• Invasion der Rete testis (ja/nein)</li> <li>• Invasion des Weichgewebes des Hilus, des Nebenhodens, oder des Samenstranges (ja/nein)</li> <li>• Germ cell neoplasia in situ im nicht-tumoreszenten Parenchym</li> <li>• pT Kategorie gemäß der TNM Klassifikation von 2017</li> </ul>	
MSAR a)	<p>Pathologieberichte für Weichgewebetumoren außer GIST müssen zusätzlich folgende Angaben enthalten (Abweichungen sind zu begründen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumorlokalisation (klinische Angabe ist Verantwortlichkeit des Klinikern);</li> <li>• Makroskopische Tumorgöße;</li> <li>• Histologischer Tumortyp nach WHO-Klassifikation;</li> <li>• Histologischer Tumorgrad nach FNCLCC (sofern anwendbar);</li> <li>• Tiefenlokalisation;</li> <li>• Lokal infiltrierte Strukturen;</li> <li>• Klassifikation pT: Angaben zu befallenen Bezirken und Unterbezirken, infiltrierten anatomischen Strukturen sind Verantwortlichkeit des Klinikern (TNM-Klassifikation kann auch interdisziplinär festgelegt werden, z.B. postoperative Tumorkonferenz);</li> <li>• R-Status und Sicherheitsabstände in mm;</li> <li>• bei Zustand nach neoadjuvanter Therapie: Angabe zum Anteil der Tumornekrose/ Tumorregression</li> </ul>	
	<p>b) Pathologieberichte für GIST müssen zusätzlich folgende Angaben enthalten (Abweichungen sind zu begründen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitosezahl (in einer Fläche von 5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Tumorlokalisation (klinische Angabe ist Verantwortlichkeit des Klinikern);</li> <li>• Makroskopische Tumorgöße;</li> <li>• R-Status;</li> <li>• Angaben zu Abwesenheit/Vorhandensein einer Tumorruptur nach außen;</li> <li>• bei Zustand nach neoadjuvanter Therapie: Angabe zum Anteil der Tumornekrose/ Tumorregression.</li> </ul>	
Änderungen gegenüber Version vom 14.12.2021		

## 8.12 Lymphknoten (LK)

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle im Operationspräparat enthaltenen Lymphknoten sind makroskopisch und mikroskopisch zu untersuchen</li> <li>Abweichungen von Mindestzahlen der Leitlinien sind interdisziplinär zu diskutieren</li> <li>Die Untersuchung der Lymphknoten hat gemäß den Leitlinien zu erfolgen</li> <li>Die Lokalisation der LK (zumindest regionär vs. Tumor-fern) ist anzugeben</li> </ul>		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
DZ	Mind. 12 LK im Operationspräparat zu untersuchen. (Qualitätsindikator Leitlinie)	Angaben im Kennzahlenbogen Darm (Excel-Vorlage)	
MM	Nach D2-LAD sind mind. 25 regionäre LK im Operationspräparat zu untersuchen.		
MP	Mind. 12 regionäre LK im Operationspräparat zu untersuchen.	Angabe im Kennzahlenbogen Pankreas (Excel-Vorlage)	
MS	Nach Zweifeld-LAD sind mind. 20 regionäre LK im Operationspräparat zu untersuchen.		
GZ	Endometrium-Ca <ul style="list-style-type: none"> <li>Angabe der Zahl der befallenen Lymphknoten im Verhältnis zur Zahl der entfernten Lymphknoten in Zuordnung zur Entnahmelokalisation (pelvin, paraaortal),</li> <li>Angabe der Ausdehnung der größten Lymphknotenmetastase in mm/cm,</li> <li>Angabe des Fehlens/Nachweises eines Kapseldurchbruches der Lymphknotenmetastase,</li> <li>Angabe des Nachweises isolierter Tumorzellen im Lymphknoten sowie des Nachweises von Lymphgefäßeinbrüchen im perinodalen Fettgewebe und/oder der Lymphknotenkapsel.</li> </ul>		
HZ	Es sollen folgende Informationen im histopathologischen Befund des Wächterlymphknotens enthalten sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachweis von Nävus- oder Melanomzellen</li> <li>Im Fall von Melanomzellen Angabe prognostisch wichtiger Parameter (z.B. lt. LL: größter Durchmesser der größten Tumorzellsammlung, maximale Eindringtiefe von Melanomzellen in das Lymphknotenparenchym, Invasion von Melanomzellen in die Lymphknotenkapsel oder der Kapseldurchbruch, Lokalisation von Melanomzellen in perinodalen Lymphgefäßen)</li> <li>Größter Durchmesser der Mikrometastase</li> </ul>		
	Pro Region ist eine Mindestzahl von 6 Lymphknoten zu untersuchen		
LZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lokalisation der LK (IASLC-Klassifikation) ist anzugeben</li> <li>Richtwert: Mind. 6 LK sollen im Operationspräparat untersucht werden</li> </ul>		

### 8.12 Lymphknoten (LK)

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
PZ	Angabe evtl. Kapselpenetration		
MB	Befundbericht Lymphonodektomie Der Befundbericht soll mindestens die folgenden Angaben umfassen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalisation</li> <li>• Zahl der nachgewiesenen/befallenen Lymphknoten</li> <li>• Kapselüberschreitendes Wachstum (j/n)</li> <li>• max. Metastasengröße (mm, eindimensional)</li> </ul>		
MB	Nach pelviner, beidseitiger Lymphonodektomie ist eine Mindestzahl von 10 Lymphknoten im Operationspräparat zu untersuchen.		

### 8.13 Resektions-/Sicherheitsabstand

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Angabe des Pathologen zu den Resektionsrändern hat grundsätzlich zu erfolgen (Abweichungen sind zu begründen).		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
HZ	Angabe des Dermatohistologen/Pathologen zu den Resektionsrändern hat grundsätzlich zu erfolgen (Abweichungen sind zu begründen).		
PZ	Bei R0-Status Angabe minimaler Randabstand in mm bei R1-Status Angabe der Randbeteiligung durch das Karzinom (post., postero-lateral, ant., apikal, proximal-vesikal, distal-urethral), Ausdehnung der Beteiligung (mm) sowie Fehlen/ Vorhandensein der Prostatakapsel in diesem Bereich. Abweichungen sind zu begründen.		

### 8.14 Externe Qualitätssicherung

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen (Bsp. Benchmarking, externer Qualitätszirkel) insbesondere an Ringversuchen (Bsp. QUIP) alle 2 Jahre.		
	Konsiliarische Zweitbefundung Ermöglichung konsiliarischer Zweitbefundung, wenn durch Klinik oder Pat. erbeten bzw. eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist.		
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>		
BZ	Regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen insbesondere Ringversuchen jährlich		
GZ	Der Prozess der externen Zweitbefundung ist darzustellen, insbesondere für seltene Tumoren (z.B. Trophoblast-Tumore, BOT, Sarkome).		

### 8.14 Externe Qualitätssicherung

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
VZ DZ	Der Prozess der externen Zweitbefundung ist darzulegen. Weiteres Bsp. externe Qualitätssicherung: - KRAS-Testung sofern im VZ durchgeführt	
HAEZ	Es sollte insbesondere die erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen zu Durchflusszytometrie und Zytomorphologie nachgewiesen werden.	
HZ	Regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen (Bsp. QUIP, Benchmarking, externer Qualitätszirkel) jährlich, z. B. Schnittseminare	
LZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obligate Teilnahme an PD-L1-Ringversuch mind. alle 2 Jahre (wenn möglich)</li> <li>Für EGFR sollte dokumentiert werden ob es sich um eine Exon 21, Exon 19 Mutation handelt oder um eine uncommon mutation.</li> </ul>	
PZ	Weiteres Bsp. externe Qualitätssicherung: - Gleason-Schule	
	Verschiebung gegenüber Version vom 14.12.2021 in den Erhebungsbogen für Zentren für hämatologische Neoplasien	

### 8.15 Qualitätszirkel

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es sind mind. 3 x jährlich Qualitätszirkel durchzuführen, in denen onkologische Themen betrachtet werden</li> <li>Terminliche Planung z.B. über Qualifizierungsplan</li> <li>Qualitätszirkel sind zu protokollieren.</li> </ul> <p>Teilnahme ist in Summe und nicht für jedes Organ einzeln nachzuweisen; Qualitätszirkel können interdisziplinär, organbezogen und/oder organübergreifend sein (zentrale Q-Zirkel des Onkologischen Zentrums gemäß EB OZ Kap. 1.2.14 werden z.B. anerkannt).</p>	

### 8.16 Fortbildung

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist ein Schulungsplan für das ärztliche und nicht-ärztliche Personal vorzulegen, in dem die für einen Jahreszeitraum geplanten Qualifizierungen dargestellt sind (bei HZ nur für ärztl. Personal).</li> <li>Jährlich mind. 1 spezifische Fort-/Weiterbildung pro Mitarbeiter, sofern dieser qualitätsrelevante Tätigkeiten für das Zentrum wahrnimmt.</li> </ul>	
	<b>Organspezifische Besonderheiten</b>	

### 8.16 Fortbildung

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
BZ	Die Fort-/ Weiterbildung sollte durch eine berufsspezifische Fachgesellschaft erfolgen.	
VZ DZ	Die Fortbildung soll organspezifisch durch eine berufsspezifische Fachgesellschaft erfolgen.	
LZ	Für ärztliche Mitarbeiter regelmäßige auf die Lungenpathologie bezogene Fortbildungen (hierzu gehören u.a. Seminare der IAP und wissenschaftliche Kongresse). Die Fortbildung soll organspezifisch durch eine berufsspezifische Fachgesellschaft erfolgen.	
PZ	Ärztliche MitarbeiterInnen besuchen regelmäßig (mind. 1 x jährl.) auf die Prostatapathologie bezogene Fortbildungen (hierzu gehören u.a. Seminare der IAP und wissenschaftliche Kongresse (Programme)).	

### 8.17 Weitere organspezifische Anforderungen

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
BZ	Familiäres Mammakarzinom Der Pathologe sollte beim gemeinsamen Auftreten der folgenden Punkte auf die Möglichkeit eines erblichen Hintergrundes hinweisen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invasives Ca (NOS) mit medullären Eigenschaften</li> <li>• G3-Morphologie</li> <li>• Östrogen-, Progesteron- und HER-2-Status neg. (triple negativ)</li> </ul>	
BZ	Auswertung HER-2-Status Jährliche Auswertung des IHC-Score unterteilt nach 0, 1+, 2+ u. 3+	
GZ	Bei V.a. HNPCC/Lynch-Syndrom bei Pat. mit Endometrium-Ca (= positive Checkliste) Umsetzung des Algorithmus: <a href="https://www.krebsgesellschaft.de/zertdokumente.html">https://www.krebsgesellschaft.de/zertdokumente.html</a>  Voraussetzung für: <ul style="list-style-type: none"> <li>• immunhistochem. Untersuchung der MMR-Proteine: Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am IHC-Ringversuch für KRK (gilt auch für delegierte Leistungen)</li> <li>• MSI-Analyse: Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am MSI-Ringversuch für KRK (gilt auch für delegierte Leistungen)</li> </ul>	
DZ	Mikrosatelliteninstabilität Falls die Untersuchung nicht direkt beim Pathologen erfolgt, ist eine Kooperationsvereinbarung zu treffen.	
DZ	Diagnostik Die MSI-Testung soll erfolgen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entsprechend des LL-Algorithmus bei pos. Pat.fragebogen mit V.a. hereditäres KRK (<a href="#">LL KRK: „Algorithmus: Genetische Diagnostik und Vorsorge“</a>)</li> </ul>	

**8.17 Weitere organspezifische Anforderungen**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Pat. zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr mit MSI-verdächtiger Histologie</li> <li>• bei mKRK fakultativ für die Festlegung der Therapiestrategie</li> <li>• vor einer adjuv. Chemotherapie im Stad. II falls indiziert</li> </ul>	
HAEZ	<p>Referenzpathologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis der Zusammenarbeit mit einer Referenzpathologie (namentliche Nennung) für Lymphome oder Nachweis, dass diese Rolle durch das Zentrum ausgefüllt werden kann.</li> <li>• Der Ablauf zur Einholung einer referenzpathologischen Beurteilung, ist zu beschreiben und an einzelnen Beispielen nachzuweisen.</li> </ul>	
MKIO	Telefonische Rückmeldung ( <b>sofortige Vorabmitteilung</b> ) auffälliger, interventionsbedürftiger Befunde innerhalb eines Arbeitstages (vgl. EB KIO 2.2.3). Die alleinige Übermittlung per Fax ist nicht ausreichend. Der Prozess ist zu beschreiben.	
MKIO	<b>Referenzpathologie</b> muss sichergestellt werden: Versendung innerhalb von max. 5 Werktagen nach Eingang (Ausnahme: z.B. Entkalkung).	
MKIO	Die Versendung der Präparate für die <b>molekulare Diagnostik</b> muss spätestens parallel zum Versand zur Referenzdiagnostik/histopathologischen Begutachtung erfolgen (Prozessbeschreibung). Die Notwendigkeiten einer späteren humangenetischen Diagnostik müssen bei der Aufbereitung der Proben für molekulare Diagnostik berücksichtigt werden, sofern es die Probenmenge erlaubt (z.B. Asservierung von Frischgewebe).	
MKIO	Das Zentrum ist zur Teilnahme an der <b>Referenzdiagnostik</b> und zum Versand von Untersuchungsmaterial entsprechend der Studienprotokolle verpflichtet (s. EB KIO 1.7.3).	
MKIO	<p>Neuropathologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Klinikstandorte, die neurochirurgische Eingriffe im Rahmen der KIONK-Zentren durchführen, muss 1 Facharzt für Neuropathologie benannt sein.</li> <li>• 1 Vertreter mit der gleichen Qualifikation muss benannt sein.</li> <li>• Der Facharzt muss werktätlich u.a. für die Schnellschnittdiagnostik zur Verfügung stehen.</li> <li>• Kooperationen über 45 km sind zu begründen.</li> <li>• Alle Schnellschnitte/Präparate sind durch Neuropathologen zu befunden <ul style="list-style-type: none"> <li>- i.d.R. Neuropathologie vor Ort</li> <li>- in Ausnahmen: Zuschnitt Schnellschnitt durch Pathologen durchführbar, Beurteilung d. Schnellschnitts durch Neuropathologen.</li> </ul> </li> </ul>	
MNOZ	Histologische Klassifikation	

### 8.17 Weitere organspezifische Anforderungen

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach den Kriterien der aktuellen WHO-Klassifikation der Tumoren des zentralen Nervensystems.</li> <li>Die nach WHO-Kriterien notwendigen histologischen, zytologischen, histochemischen und immunhistochemischen Verfahren müssen etabliert sein.</li> </ul>		
MNOZ	Stereotaktische Hirnbiopsien Möglichkeit zur Bearbeitung und Erfahrung in der mikroskopischen Beurteilung von stereotaktischen Hirnbiopsien muss gegeben sein.		
MNOZ	Zytopathologische Beurteilung Möglichkeit zur Bearbeitung und Erfahrung in der mikroskopischen Beurteilung von liquorzytologischen Präparaten muss gegeben sein.		
MNOZ	Molekulare Diagnostik Möglichkeit zur Bestimmung neuroonkologisch relevanter molekularer Marker entsprechend WHO-Klassifikation 2016 (z.B. MGMT Promotor-methylierung, 1p/ 19q Deletion, Mutationen im IDH1 Gen) (ggfs. in Kooperation) und Erfahrung in der Beurteilung molekularpathologischer Befunde muss vorhanden sein.		
MNOZ	Asservierung von Gewebeproben Zusätzlich zur Asservierung von Paraffinblöcken und Schnittpräparaten muss die Möglichkeit zur Asservierung von schockgefrorenen Gewebeproben bei mindestens -80°C vorhanden sein.		
MNOZ	Beteiligung an klinischen Studien und translationalen Forschungsprojekten <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung/ Versand von Gewebeproben für referenzhistologische Begutachtung im Rahmen klinischer Studien.</li> <li>Asservierung, Bereitstellung und ggfs. Versand von Gewebeproben für translationale Forschungsprojekte im Rahmen klinischer Studien.</li> </ul>		
MSAR	Molekulare Diagnostik Die Möglichkeit zur Bestimmung relevanter molekularer Marker ist vorzuhalten (ggf. in Kooperation). Dabei sollen sowohl diagnostisch relevante molekulare Marker (z.B. tumorspezifische Translokation) als auch prädiktive Biomarker angewendet werden. Erfahrung in der Beurteilung molekularpathologischer Befunde muss vorhanden sein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolgreiche Teilnahme an 3 Ringversuchen pro 3 Jahren, davon mind. 1 Sarkomspezifischer Ringversuch (z.B. GIST, CD117) (Nachweis).</li> <li>Für GIST gilt: Für Pat., die zu einer medikamentösen Therapie anstehen, ist eine Mutationsanalyse (KIT- bzw. PDGFRA-Gen, ggf. auch weitere Gene) verpflichtend.</li> </ul>		
MSAR	Referenzpathologie		

**8.17 Weitere organspezifische Anforderungen**

Kap.	Anforderungen	Erläuterungen Pathologie	
	Der Ablauf zur Einholung einer referenzpathologischen Beurteilung ist zu beschreiben und an einzelnen Beispielen nachzuweisen.		

**Anlage 1 - Ringversuche**

Eine Übersicht über aktuelle Ringversuche ist unter [https://www.quip.eu/de\\_DE/zerpa/trials](https://www.quip.eu/de_DE/zerpa/trials) abrufbar.